

高壓氧治療罕見合併症

試題單

會員編號：_____

姓名：_____

- () 1. 下列併發症何者未曾發生於接受高壓氧治療的病患？
- A. 中耳擠壓傷
 - B. 晶體後纖維增生
 - C. 氧抽搐
 - D. 白內障惡化
- () 2. 如何預防高壓氧併發症的發生？
- A. 高壓氧治療前謹慎評估
 - B. 高壓氧治療前詳細衛教
 - C. 進艙前再次確認
 - D. 以上皆是
- () 3. 在高壓氧艙內發生因氧中毒產生抽搐的立即處理，何者為非？
- A. 立刻減壓出艙
 - B. 立刻停止使用氧氣
 - C. 必要時給予鎮定劑
 - D. 密切觀察病人，維持呼吸到通暢
- () 4. 接受高壓氧治療時下列敘述何者有誤？
- A. 體溫過高者進艙容易引發抽搐
 - B. 只要病患耳朵能適應壓力即可快速減壓
 - C. 只要病患耳朵能適應壓力即可快速加壓
 - D. 上呼吸道感染病患進艙容易產生擠壓傷
- () 5. 一位意識清醒的病患因一氧化碳中毒需緊急接受高壓氧治療，入艙前病人主訴感冒，耳朵無法平衡。此時應如何處置？
- A. 延期接受高壓氧治療
 - B. 因為情況緊急，所以不管感冒問題，立即進艙
 - C. 可先給予去充血的藥物治療再進艙，且緩慢加壓
 - D. 讓病人自行決定是否入艙治療

